

# Wybrane wzory matematyczne

$$\begin{aligned}
 & A' = (x, -y) \quad \text{tg } \alpha \quad (\Delta ABC \sim \Delta DEF) \\
 & \frac{a_{n+1}}{2} y = ax + b \quad b = f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_0 \\
 & P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + \dots + P(A|B_n) \cdot P(B_n) \\
 & \frac{1}{2}(a_n + a_{n+1}) y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0) \quad \sin \alpha \quad a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n \quad A' = (x, -y) \\
 & \text{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\text{tg} \alpha + \text{tg} \beta}{1 - \text{tg} \alpha \cdot \text{tg} \beta} \quad a \neq 0 \quad (\Delta ABC \sim \Delta DEF) \quad \text{tg} \alpha - \text{tg} \beta \\
 & \frac{\text{tg}(\alpha - \beta)}{1 + \text{tg} \alpha \cdot \text{tg} \beta} \quad \alpha \in [^\circ] \quad A' = (x, -y) \quad P = (x_0, y_0) \quad y = ax + b \quad \sqrt{3} \quad \beta \in [^\circ] \quad P = (x_0, y_0) \\
 & \sin(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \sin \alpha \quad a_{n+1} \cos(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \cos \alpha \quad \text{tg}(\alpha + k \cdot 180^\circ) = \text{tg} \alpha, \quad k - \text{całkowite} \\
 & \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{2} \quad n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{k!} \quad \beta \in [^\circ] \quad y \neq 0 \quad \text{tg} \alpha \quad P(B_i) > 0 \text{ dla } 1 \leq i \leq n \\
 & (\Delta ABC \sim \Delta DEF) \quad \overline{AB} \sin \alpha^{(n-k)!} \\
 & y = ax + b \quad \text{tg} \alpha \quad \beta \in [^\circ] \\
 & \frac{\sqrt{3}}{2} \quad 2a + c = b + d \quad f'(x) = \frac{-a}{x^2} \quad \text{tg} \alpha \quad \beta \in [^\circ] \\
 & (a_n) \quad a_1 = a_2 \quad P = (x_0, y_0) \\
 & \log_{10} x \quad \overline{AB} \quad (\Delta ABC \sim \Delta DEF) \quad a_{n+1} \\
 & \frac{a}{a} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{a_n} \quad \sqrt{3} \quad \frac{n+1}{2} \\
 & (\Delta ABC \sim \Delta DEF) \quad n \beta \in [^\circ] \quad \frac{\sin \alpha}{\cos \beta} \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{tg} \alpha \\
 & i \neq j, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n \quad (a_n) \\
 & \frac{\text{tg}(\alpha + \beta) + \frac{\text{tg} \alpha \cdot \text{tg} \beta}{1 - \text{tg} \alpha \cdot \text{tg} \beta}}{1 - \frac{\text{tg} \alpha \cdot \text{tg} \beta}{1 - \text{tg} \alpha \cdot \text{tg} \beta}} \quad \frac{\text{tg}(\alpha - \beta) + \frac{\text{tg} \alpha \cdot \text{tg} \beta}{1 - \text{tg} \alpha \cdot \text{tg} \beta}}{1 - \frac{\text{tg} \alpha \cdot \text{tg} \beta}{1 - \text{tg} \alpha \cdot \text{tg} \beta}} \\
 & A' = (x, -y) \quad x > 0 \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad P = (x_0, y_0) \\
 & a_{n+1} \quad f(x) = a(x-x_1)(x-x_2) \quad \frac{\sin \alpha}{\cos \beta} \quad 0 \leq k \leq n \\
 & \text{tg} \alpha \quad \frac{a_{n+1}}{2} \quad \text{tg} \alpha \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \log_{10} x \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 & a + c = b + d \quad 2 \text{tg} \alpha \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \log_{10} x \\
 & |AB| = |DE|, |\angle BAC| = |\angle EDF|, |\angle ABC| = |\angle DEF| \\
 & y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0) \\
 & \frac{Ax + By + C = 0, \quad b \geq 0}{w_1 \cdot a_1 + w_2 \cdot a_2 + \dots + w_n \cdot a_n} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \Delta \geq 0 \\
 & \Delta > 0 \quad w_1 + w_2 + \dots + w_n \cdot c \\
 & P(B_i) > 0 \text{ dla } 1 \leq i \leq n \\
 & \frac{a_{n+1}}{2} \quad (\Delta ABC \sim \Delta DEF) \quad A \\
 & P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |(x_B - x_A)(y_C - y_A) - (y_B - y_A)(x_C - x_A)| \\
 & y = ax + b \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (a_1 = a_2) \\
 & a = \frac{f'(x_0)}{f'(a_n)} \quad (x_0 \beta \in [^\circ]) \\
 & \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = s \cdot \overline{OA} \quad \Delta < 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & y = ax + b \quad \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n} \\
 & y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0) \quad \Delta \geq 0 \\
 & \frac{1}{2} \left( \frac{a_n}{2} + \frac{a_{n+1}}{2} + 1 \right) \frac{\sqrt{3}}{2} \quad a_1 = a_2 \\
 & \frac{1}{2} \left( \frac{a_n}{2} + \frac{a_{n+1}}{2} + 1 \right) \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \Delta < 0 \\
 & b \geq 0 \quad a + c = b + d \quad y = ax + b \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 & \frac{w_1 \cdot a_1 + w_2 \cdot a_2 + \dots + w_n \cdot a_n}{w_1 + w_2 + \dots + w_n} \quad \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 & a_1 = a_2 \quad w_1 + w_2 + \dots + w_n \quad a_1 = a_2 \quad 3
 \end{aligned}$$



## Spis treści

1. Wartość bezwzględna liczby .....	1
2. Potęgi i pierwiastki.....	1
3. Logarytmy .....	2
4. Silnia. Współczynnik dwumianowy.....	2
5. Wzór dwumianowy Newtona.....	2
6. Wzory skróconego mnożenia.....	3
7. Ciągi .....	3
8. Funkcja kwadratowa .....	4
9. Geometria analityczna.....	4
10. Planimetria .....	6
11. Stereometria .....	12
12. Trygonometria .....	14
13. Kombinatoryka.....	16
14. Rachunek prawdopodobieństwa.....	17
15. Parametry danych statystycznych .....	18
16. Granica ciągu.....	18
17. Pochodna funkcji.....	19
18. Tablica wartości funkcji trygonometrycznych .....	20

# 1. WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA LICZBY

Wartość bezwzględną liczby rzeczywistej  $x$  definiujemy wzorem:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{dla } x \geq 0 \\ -x & \text{dla } x < 0 \end{cases}$$

Liczba  $|x|$  jest to odległość na osi liczbowej punktu  $x$  od punktu 0.

Dla dowolnej liczby  $x$  mamy:

$$|x| \geq 0 \quad |x| = 0 \text{ wtedy i tylko wtedy, gdy } x = 0 \quad |-x| = |x|$$

Dla dowolnych liczb  $x, y$  mamy:

$$|x + y| \leq |x| + |y| \quad |x - y| \leq |x| + |y| \quad |x \cdot y| = |x| \cdot |y|$$

Ponadto, jeśli  $y \neq 0$ , to  $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$ .

Dla dowolnych liczb  $a$  oraz  $r \geq 0$  mamy:

$$|x - a| \leq r \text{ wtedy i tylko wtedy, gdy } a - r \leq x \leq a + r$$

$$|x - a| \geq r \text{ wtedy i tylko wtedy, gdy } x \leq a - r \text{ lub } x \geq a + r$$

## 2. POTĘGI I PIERWIĄSTKI

Niech  $n$  będzie liczbą całkowitą dodatnią. Dla dowolnej liczby  $a$  definiujemy jej  $n$ -tą potęgę:

$$a^n = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ razy}}$$

Pierwiastkiem arytmetycznym  $\sqrt[n]{a}$  stopnia  $n$  z liczby  $a \geq 0$  nazywamy liczbę  $b \geq 0$  taką, że  $b^n = a$ .

W szczególności, dla dowolnej liczby  $a$  zachodzi równość:  $\sqrt{a^2} = |a|$ .

Jeżeli  $a < 0$  oraz liczba  $n$  jest nieparzysta, to  $\sqrt[n]{a}$  oznacza liczbę  $b < 0$  taką, że  $b^n = a$ .

Pierwiastki stopni parzystych z liczb ujemnych nie istnieją.

Niech  $m, n$  będą liczbami całkowitymi dodatnimi. Definiujemy:

$$- \text{ dla } a \neq 0: \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{oraz} \quad a^0 = 1$$

$$- \text{ dla } a \geq 0: \quad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$- \text{ dla } a > 0: \quad a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$$

Niech  $r, s$  będą dowolnymi liczbami rzeczywistymi. Jeśli  $a > 0$  i  $b > 0$ , to zachodzą równości:

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s} \quad (a^r)^s = a^{r \cdot s} \quad \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$$

$$(a \cdot b)^r = a^r \cdot b^r \quad \left( \frac{a}{b} \right)^r = \frac{a^r}{b^r}$$

Jeżeli wykładniki  $r, s$  są liczbami całkowitymi, to powyższe wzory obowiązują dla wszystkich liczb  $a \neq 0$  i  $b \neq 0$ .

### 3. LOGARYTMY

Logarytmem  $\log_a c$  dodatniej liczby  $c$  przy dodatniej i różnej od 1 podstawie  $a$  nazywamy wykładnik  $b$  potęgi, do której należy podnieść  $a$ , aby otrzymać  $c$ :

$$\log_a c = b \text{ wtedy i tylko wtedy, gdy } a^b = c$$

Równoważnie:

$$a^{\log_a c} = c$$

Dla dowolnych liczb  $x > 0$ ,  $y > 0$  oraz  $r$  zachodzą wzory:

$$\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y \quad \log_a x^r = r \cdot \log_a x \quad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

Wzór na zamianę podstawy logarytmu:

jeżeli  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ,  $b > 0$ ,  $b \neq 1$  oraz  $c > 0$ , to

$$\log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b}$$

Logarytm  $\log_{10} x$  można też zapisać jako  $\log x$  lub  $\lg x$ .

### 4. SILNIA. WSPÓŁCZYNNIK DWUMIANOWY

Silnią liczby całkowitej dodatniej  $n$  nazywamy iloczyn kolejnych liczb całkowitych od 1 do  $n$  włącznie:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$$

Ponadto przyjmujemy umowę, że  $0! = 1$ .

Dla dowolnej liczby całkowitej  $n \geq 0$  zachodzi związek:

$$(n+1)! = n! \cdot (n+1)$$

Dla liczb całkowitych  $n, k$  spełniających warunki  $0 \leq k \leq n$  definiujemy współczynnik dwumianowy  $\binom{n}{k}$  (symbol Newtona):

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Zachodzą równości:

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!}$$
$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad \binom{n}{0} = 1 \quad \binom{n}{n} = 1$$

### 5. WZÓR DWUMIANOWY NEWTONA

Dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej  $n$  oraz dla dowolnych liczb  $a, b$  mamy:

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \dots + \binom{n}{k} a^{n-k} b^k + \dots + \binom{n}{n-1} a b^{n-1} + \binom{n}{n} b^n$$

## 6. WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA

Dla dowolnych liczb  $a, b$ :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej  $n$  oraz dowolnych liczb  $a, b$  zachodzi wzór:

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + a^{n-k}b^{k-1} + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

W szczególności:

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$a^2 - 1 = (a-1)(a+1)$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^3 - 1 = (a-1)(a^2 + a + 1)$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 + 1 = (a+1)(a^2 - a + 1)$$

$$a^n - 1 = (a-1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + a + 1)$$

## 7. CIĄGI

### • Ciąg arytmetyczny

Wzór na  $n$ -ty wyraz ciągu arytmetycznego  $(a_n)$  o pierwszym wyrazie  $a_1$  i różnicy  $r$ :

$$a_n = a_1 + (n-1)r$$

Wzór na sumę  $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$  początkowych  $n$  wyrazów ciągu arytmetycznego:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + (n-1)r}{2} \cdot n$$

Między sąsiednimi wyrazami ciągu arytmetycznego zachodzi związek:

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2} \quad \text{dla } n \geq 2$$

### • Ciąg geometryczny

Wzór na  $n$ -ty wyraz ciągu geometrycznego  $(a_n)$  o pierwszym wyrazie  $a_1$  i ilorazie  $q$ :

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1} \quad \text{dla } n \geq 2$$

Wzór na sumę  $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$  początkowych  $n$  wyrazów ciągu geometrycznego:

$$S_n = \begin{cases} a_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q} & \text{dla } q \neq 1 \\ n \cdot a_1 & \text{dla } q = 1 \end{cases}$$

Między sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego zachodzi związek:

$$a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1} \quad \text{dla } n \geq 2$$

### • Procent składany

Jeżeli kapitał początkowy  $K$  złożymy na  $n$  lat w banku, w którym oprocentowanie lokat wynosi  $p\%$  w skali rocznej i kapitalizacja odsetek następuje po upływie każdego roku trwania lokaty, to kapitał końcowy  $K_n$  wyraża się wzorem:

$$K_n = K \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$

## 8. FUNKCJA KWADRATOWA

Postać ogólna funkcji kwadratowej:  $f(x) = ax^2 + bx + c$ ,  $a \neq 0$ ,  $x \in R$ .

Wzór każdej funkcji kwadratowej można doprowadzić do postaci kanonicznej:

$$f(x) = a(x-p)^2 + q, \text{ gdzie } p = -\frac{b}{2a}, q = -\frac{\Delta}{4a}, \Delta = b^2 - 4ac$$

Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola o wierzchołku w punkcie o współrzędnych  $(p, q)$ . Ramiona paraboli skierowane są do góry, gdy  $a > 0$ ; do dołu, gdy  $a < 0$ .

Liczba miejsc zerowych funkcji kwadratowej  $f(x) = ax^2 + bx + c$  (liczba pierwiastków trójmianu kwadratowego, liczba rzeczywistych rozwiązań równania  $ax^2 + bx + c = 0$ ), zależy od wyróżnika  $\Delta = b^2 - 4ac$ :

- jeżeli  $\Delta < 0$ , to funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych (trójmian kwadratowy nie ma pierwiastków rzeczywistych, równanie kwadratowe nie ma rozwiązań rzeczywistych),
- jeżeli  $\Delta = 0$ , to funkcja kwadratowa ma dokładnie jedno miejsce zerowe (trójmian kwadratowy ma jeden pierwiastek podwójny, równanie kwadratowe ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste):  $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$
- jeżeli  $\Delta > 0$ , to funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe (trójmian kwadratowy ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste, równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania rzeczywiste):

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Jeśli  $\Delta \geq 0$ , to wzór funkcji kwadratowej można doprowadzić do postaci iloczynowej:

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

### • Wzory Viéte'a

Jeżeli  $\Delta \geq 0$ , to

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

## 9. GEOMETRIA ANALITYCZNA

### • Odcinek


Długość odcinka o końcach w punktach

$A = (x_A, y_A)$ ,  $B = (x_B, y_B)$  jest dana wzorem:

$$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Współrzędne środka odcinka  $AB$ :

$$\left( \frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$



- Wektory

Współrzędne wektora  $\overrightarrow{AB}$ :

$$\overrightarrow{AB} = [x_B - x_A, y_B - y_A]$$

Jeżeli  $\vec{u} = [u_1, u_2]$ ,  $\vec{v} = [v_1, v_2]$  są wektorami, zaś  $a$  jest liczbą, to

$$\vec{u} + \vec{v} = [u_1 + v_1, u_2 + v_2] \qquad a \cdot \vec{u} = [a \cdot u_1, a \cdot u_2]$$

- Prosta

Równanie ogólne prostej:

$$Ax + By + C = 0,$$

gdzie  $A^2 + B^2 \neq 0$  (tj. współczynniki  $A, B$  nie są równocześnie równe 0).


Jeżeli  $A = 0$ , to prosta jest równoległa do osi  $Ox$ ; jeżeli  $B = 0$ , to prosta jest równoległa do osi  $Oy$ ; jeżeli  $C = 0$ , to prosta przechodzi przez początek układu współrzędnych.

Jeżeli prosta nie jest równoległa do osi  $Oy$ , to ma ona równanie kierunkowe:

$$y = ax + b$$

Liczba  $a$  to współczynnik kierunkowy prostej:

$$a = \operatorname{tg} \alpha$$



Współczynnik  $b$  wyznacza na osi  $Oy$  punkt, w którym dana prosta ją przecina.

Równanie kierunkowe prostej o współczynniku kierunkowym  $a$ , która przechodzi przez punkt  $P = (x_0, y_0)$ :

$$y = a(x - x_0) + y_0$$

Równanie prostej, która przechodzi przez dwa dane punkty  $A = (x_A, y_A)$ ,  $B = (x_B, y_B)$ :

$$(y - y_A)(x_B - x_A) - (y_B - y_A)(x - x_A) = 0$$

- Prosta i punkt

Odległość punktu  $P = (x_0, y_0)$  od prostej o równaniu  $Ax + By + C = 0$  jest dana wzorem:

$$\frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

- Para prostych

Dwie proste o równaniach kierunkowych:

$$y = a_1x + b_1 \qquad y = a_2x + b_2$$

spełniają jeden z następujących warunków:

– są równoległe, gdy  $a_1 = a_2$

– są prostopadłe, gdy  $a_1a_2 = -1$

– tworzą kąt ostry  $\varphi$  i  $\operatorname{tg} \varphi = \left| \frac{a_1 - a_2}{1 + a_1a_2} \right|$

Dwie proste o równaniach ogólnych:

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0 \quad A_2x + B_2y + C_2 = 0$$

- są równoległe, gdy  $A_1B_2 - A_2B_1 = 0$
- są prostopadłe, gdy  $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$
- tworzą kąt ostry  $\varphi$  i  $\operatorname{tg} \varphi = \left| \frac{A_1B_2 - A_2B_1}{A_1A_2 + B_1B_2} \right|$
- Trójkąt

Pole trójkąta  $ABC$  o wierzchołkach  $A = (x_A, y_A)$ ,  $B = (x_B, y_B)$ ,  $C = (x_C, y_C)$ , jest dane wzorem:

$$P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |(x_B - x_A)(y_C - y_A) - (y_B - y_A)(x_C - x_A)|$$

Środek ciężkości trójkąta  $ABC$ , czyli punkt przecięcia jego środkowych, ma współrzędne:

$$\left( \frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \right)$$

- Przekształcenia geometryczne

- przesunięcie o wektor  $\vec{u} = [a, b]$  przekształca punkt  $A = (x, y)$  na punkt  $A' = (x + a, y + b)$
- symetria względem osi  $Ox$  przekształca punkt  $A = (x, y)$  na punkt  $A' = (x, -y)$
- symetria względem osi  $Oy$  przekształca punkt  $A = (x, y)$  na punkt  $A' = (-x, y)$
- symetria względem punktu  $(a, b)$  przekształca punkt  $A = (x, y)$  na punkt  $A' = (2a - x, 2b - y)$
- jednokładność o środku w punkcie  $O$  i skali  $s \neq 0$  przekształca punkt  $A$  na punkt  $A'$  taki, że  $\overline{OA'} = s \cdot \overline{OA}$ , a więc, jeśli  $O = (x_0, y_0)$ , to jednokładność ta przekształca punkt  $A = (x, y)$  na punkt  $A' = (sx + (1-s)x_0, sy + (1-s)y_0)$

- Równanie okręgu



Równanie okręgu o środku w punkcie  $S = (a, b)$  i promieniu  $r > 0$ :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

lub  $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$  gdy  $r^2 = a^2 + b^2 - c > 0$

## 10. PLANIMETRIA

- Cechy przystawiania trójkątów






To, że dwa trójkąty  $ABC$  i  $DEF$  są przystające ( $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ ), możemy stwierdzić na podstawie każdej z następujących **cech przystawiania trójkątów**:


- cecha przystawiania „bok – bok – bok”:  
odpowiadające sobie boki obu trójkątów mają te same długości:  $|AB| = |DE|$ ,  $|AC| = |DF|$ ,  $|BC| = |EF|$
- cecha przystawiania „bok – kąt – bok”:  
dwa boki jednego trójkąta są równe odpowiadającym im bokom drugiego trójkąta oraz kąt zawarty między tymi bokami jednego trójkąta ma taką samą miarę jak odpowiadający mu kąt drugiego trójkąta, np.  $|AB| = |DE|$ ,  $|AC| = |DF|$ ,  $|\sphericalangle BAC| = |\sphericalangle EDF|$
- cecha przystawiania „kąt – bok – kąt”:  
jeden bok jednego trójkąta ma tę samą długość, co odpowiadający mu bok drugiego trójkąta oraz miary odpowiadających sobie kątów obu trójkątów, przyległych do boku, są równe, np.  $|AB| = |DE|$ ,  $|\sphericalangle BAC| = |\sphericalangle EDF|$ ,  $|\sphericalangle ABC| = |\sphericalangle DEF|$

• Cechy podobieństwa trójkątów



To, że dwa trójkąty  $ABC$  i  $DEF$  są podobne ( $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ), możemy stwierdzić na podstawie każdej z następujących **cech podobieństwa trójkątów**:

- cecha podobieństwa „bok – bok – bok”:  
długości boków jednego trójkąta są proporcjonalne do odpowiednich długości boków drugiego trójkąta,  
np.  $\frac{|AB|}{|DE|} = \frac{|AC|}{|DF|} = \frac{|BC|}{|EF|}$
- cecha podobieństwa „bok – kąt – bok”:  
długości dwóch boków jednego trójkąta są proporcjonalne do odpowiednich długości dwóch boków drugiego trójkąta i kąty między tymi parami boków są przystające, np.  $\frac{|AB|}{|DE|} = \frac{|AC|}{|DF|}$ ,  $|\sphericalangle BAC| = |\sphericalangle EDF|$
- cecha podobieństwa „kąt – kąt – kąt”:  
dwa kąty jednego trójkąta są przystające do odpowiednich dwóch kątów drugiego trójkąta (więc też i trzecie kąty obu trójkątów są przystające):  $|\sphericalangle BAC| = |\sphericalangle EDF|$ ,  $|\sphericalangle ABC| = |\sphericalangle DEF|$ ,  $|\sphericalangle ACB| = |\sphericalangle DFE|$



Przyjmujemy oznaczenia w trójkącie ABC:

$a, b, c$	– długości boków, leżących odpowiednio naprzeciwko wierzchołków $A, B, C$
$2p = a + b + c$	– obwód trójkąta
$\alpha, \beta, \gamma$	– miary kątów przy wierzchołkach $A, B, C$
$h_a, h_b, h_c$	– wysokości opuszczone z wierzchołków $A, B, C$
$R, r$	– promienie okręgów opisanego i wpisanego

• Twierdzenie sinusów

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

• Twierdzenie cosinusów

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

• Wzory na pole trójkąta

$$P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a = \frac{1}{2} \cdot b \cdot h_b = \frac{1}{2} \cdot c \cdot h_c$$

$$P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \gamma = \frac{1}{2} a \cdot c \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} b \cdot c \cdot \sin \alpha$$

$$P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} a^2 \frac{\sin \beta \cdot \sin \gamma}{\sin \alpha} = \frac{1}{2} b^2 \frac{\sin \alpha \cdot \sin \gamma}{\sin \beta} = \frac{1}{2} c^2 \frac{\sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin \gamma}$$

$$P_{\Delta ABC} = \frac{abc}{4R}$$

$$P_{\Delta ABC} = 2R^2 \cdot \sin \alpha \cdot \sin \beta \cdot \sin \gamma$$

$$P_{\Delta ABC} = rp$$

$$P_{\Delta ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

• Twierdzenie Pitagorasa (wraz z twierdzeniem odwrotnym do niego)

W trójkącie ABC kąt  $\gamma$  jest prosty wtedy i tylko wtedy, gdy  $a^2 + b^2 = c^2$ .

• Związki miarowe w trójkącie prostokątnym

Załóżmy, że kąt  $\gamma$  jest prosty. Wówczas:


$$h_c^2 = |AD| \cdot |DB|$$

$$h_c = \frac{ab}{c}$$


$$a = c \cdot \sin \alpha = c \cdot \cos \beta$$

$$a = b \cdot \operatorname{tg} \alpha = b \cdot \frac{1}{\operatorname{tg} \beta}$$

$$R = \frac{1}{2} c \quad r = \frac{a+b-c}{2} = p-c$$



• Trójkąt równoboczny



$a$  – długość boku

$h$  – wysokość trójkąta

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2} \quad R = \frac{2}{3}h$$

$$P_{\Delta} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \quad r = \frac{1}{3}h$$

• Twierdzenie Talesa (wraz z twierdzeniem odwrotnym do niego)

Różne proste  $AC$  i  $BD$  przecinają się w punkcie  $P$ , przy czym spełniony jest jeden z warunków:


– punkt  $A$  leży wewnątrz odcinka  $PC$  oraz punkt  $B$  leży wewnątrz odcinka  $PD$

lub


– punkt  $A$  leży na zewnątrz odcinka  $PC$  oraz punkt  $B$  leży na zewnątrz odcinka  $PD$ .

Wówczas proste  $AB$  i  $CD$  są równoległe wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\frac{|PA|}{|AC|} = \frac{|PB|}{|BD|}$$



• Czworokąty




**Trapez**

Czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.

Wzór na pole trapezu:

$$P = \frac{a+b}{2} \cdot h$$




**Równoległobok**

Czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych.

Wzory na pole równoległoboku:

$$P = ah = a \cdot b \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} \cdot |AC| \cdot |BD| \cdot \sin \varphi$$




### Romb

Czworokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Wzory na pole rombu:

$$P = ah = a^2 \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} \cdot |AC| \cdot |BD|$$




### Deltoid

Czworokąt wypukły, który ma oś symetrii zawierającą jedną z przekątnych.

Wzór na pole deltoidu:

$$P = \frac{1}{2} \cdot |AC| \cdot |BD|$$

### • Koło




Wzór na pole koła o promieniu  $r$ :

$$P = \pi r^2$$

Obwód koła o promieniu  $r$ :

$$L = 2\pi r$$

### • Wycinek koła




Wzór na pole wycinka koła o promieniu  $r$  i kącie środkowym  $\alpha$  wyrażonym w stopniach:

$$P = \pi r^2 \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$$

Długość łuku  $AB$  wycinka koła o promieniu  $r$  i kącie środkowym  $\alpha$  wyrażonym w stopniach:

$$l = 2\pi r \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$$

### • Kąty w okręgu




Miara kąta wpisanego w okrąg jest równa połowie miary kąta środkowego, opartego na tym samym łuku.

Miary kątów wpisanych w okrąg, opartych na tym samym łuku, są równe.

Miary kątów wpisanych w okrąg, opartych na łukach równych, są równe.

- Twierdzenie o kącie między styczną i cięciwą




Dany jest okrąg o środku w punkcie  $O$  i jego cięciwa  $AB$ . Prosta  $AC$  jest styczna do tego okręgu w punkcie  $A$ . Wtedy  $|\sphericalangle AOB| = 2 \cdot |\sphericalangle CAB|$ , przy czym wybieramy ten z kątów środkowych  $AOB$ , który jest oparty na łuku znajdującym się wewnątrz kąta  $CAB$ .

- Twierdzenie o odcinkach stycznych

Jeżeli styczne do okręgu w punktach  $A$  i  $B$  przecinają się w punkcie  $P$ , to


$$|PA| = |PB|$$




- Twierdzenie o odcinkach siecznej i stycznej

Dane są: prosta przecinająca okrąg w punktach  $A$  i  $B$  oraz prosta styczna do tego okręgu w punkcie  $C$ . Jeżeli proste te przecinają się w punkcie  $P$ , to

$$|PA| \cdot |PB| = |PC|^2$$




- Okrag opisany na czworokacie



Na czworokacie mozna opisać okrag wtedy i tylko wtedy, gdy sumy miar jego przeciwleglych katów wewnetrznych są równe  $180^\circ$ :

$$\alpha + \gamma = \beta + \delta = 180^\circ$$

- Okrag wpisany w czworokat




W czworokat wypukly mozna wpisać okrag wtedy i tylko wtedy, gdy sumy dlugosci jego przeciwleglych boków są równe:

$$a + c = b + d$$

## 11. STEREOOMETRIA

- Twierdzenie o trzech prostych prostopadlych



Prosta  $k$  przebija płaszczyznę w punkcie  $P$ . Prosta  $l$  jest rzutem prostokątnym prostej  $k$  na tę płaszczyznę. Prosta  $m$  leży na tej płaszczyźnie i przechodzi przez punkt  $P$ . Wówczas prosta  $m$  jest prostopadła do prostej  $k$  wtedy i tylko wtedy, gdy jest prostopadła do prostej  $l$ .

Przyjmujemy oznaczenia:


$P$  – pole powierzchni całkowitej

$P_p$  – pole podstawy

$P_b$  – pole powierzchni bocznej

$V$  – objętość

• Prostopadłościan




$$P = 2(ab + bc + ac)$$

$$V = abc$$

gdzie  $a, b, c$  są długościami krawędzi prostopadłościanu

• Graniastosłup prosty




$$P_b = 2p \cdot h$$

$$V = P_p \cdot h$$

gdzie  $2p$  jest obwodem podstawy graniastosłupa


• Ostrosłup



$$V = \frac{1}{3} P_p \cdot h$$

gdzie  $h$  jest wysokością ostrosłupa

- Walec




$$P_b = 2\pi rh$$

$$P = 2\pi r(r + h)$$

$$V = \pi r^2 h$$

gdzie  $r$  jest promieniem podstawy,  $h$  – wysokością walca

- Stożek




$$P_b = \pi rl$$

$$P = \pi r(r + l)$$

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

gdzie  $r$  jest promieniem podstawy,  $h$  – wysokością,  $l$  – długością tworzącej stożka

- Kula




$$P = 4\pi r^2$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

gdzie  $r$  jest promieniem kuli

## 12. TRYGNOMETRIA

- Definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym




$$\sin \alpha = \frac{a}{c} \quad \sin \beta = \frac{b}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c} \quad \cos \beta = \frac{a}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b} \quad \operatorname{tg} \beta = \frac{b}{a}$$



• Definicje funkcji trygonometrycznych






$$\sin \alpha = \frac{y}{r}$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{r}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x}, \text{ gdy } x \neq 0$$

gdzie  $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$  jest promieniem wodzącym punktu  $M$

• Wykresy funkcji trygonometrycznych



• Związki między funkcjami tego samego kąta

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad \text{dla} \quad \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k - \text{całkowite}$$

• Niektóre wartości funkcji trygonometrycznych

	$0^\circ$	$30^\circ$	$45^\circ$	$60^\circ$	$90^\circ$
$\alpha$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	nie istnieje

- Funkcje sumy i różnicy kątów

Dla dowolnych kątów  $\alpha, \beta$  zachodzą równości:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta & \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \end{aligned}$$

Ponadto mamy równości:

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta} \quad \operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$$

które zachodzą zawsze, gdy są określone i mianownik prawej strony nie jest zerem.

- Funkcje podwojonego kąta

$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= 2 \sin \alpha \cos \alpha \\ \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha \\ \operatorname{tg} 2\alpha &= \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} \end{aligned}$$

- Sumy, różnice i iloczyny funkcji trygonometrycznych

$$\begin{aligned} \sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} & \sin \alpha \sin \beta &= -\frac{1}{2} (\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)) \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} & \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} (\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)) \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} & \sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)) \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \end{aligned}$$

- Wybrane wzory redukcyjne

$$\begin{aligned} \sin(90^\circ - \alpha) &= \cos \alpha & \cos(90^\circ - \alpha) &= \sin \alpha \\ \sin(90^\circ + \alpha) &= \cos \alpha & \cos(90^\circ + \alpha) &= -\sin \alpha \\ \sin(180^\circ - \alpha) &= \sin \alpha & \cos(180^\circ - \alpha) &= -\cos \alpha & \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) &= -\operatorname{tg} \alpha \\ \sin(180^\circ + \alpha) &= -\sin \alpha & \cos(180^\circ + \alpha) &= -\cos \alpha & \operatorname{tg}(180^\circ + \alpha) &= \operatorname{tg} \alpha \end{aligned}$$

- Okresowość funkcji trygonometrycznych

$$\sin(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \sin \alpha \quad \cos(\alpha + k \cdot 360^\circ) = \cos \alpha \quad \operatorname{tg}(\alpha + k \cdot 180^\circ) = \operatorname{tg} \alpha, \quad k - \text{całkowite}$$

## 13. KOMBINATORYKA

- Wariacje z powtórzeniami

Liczba sposobów, na które z  $n$  różnych elementów można utworzyć ciąg, składający się z  $k$  niekoniecznie różnych wyrazów, jest równa  $n^k$ .

- Wariacje bez powtórzeń

Liczba sposobów, na które z  $n$  różnych elementów można utworzyć ciąg, składający się z  $k$  ( $1 \leq k \leq n$ ) różnych wyrazów, jest równa

$$n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- Permutacje

Liczba sposobów, na które  $n$  ( $n \geq 1$ ) różnych elementów można ustawić w ciąg, jest równa  $n!$ .

- Kombinacje

Liczba sposobów, na które spośród  $n$  różnych elementów można wybrać  $k$  ( $0 \leq k \leq n$ ) elementów, jest równa  $\binom{n}{k}$ .

## 14. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

- Własności prawdopodobieństwa

$$0 \leq P(A) \leq 1 \quad \text{dla każdego zdarzenia } A \subset \Omega$$

$$P(\Omega) = 1 \quad \Omega - \text{zdarzenie pewne}$$

$$P(\emptyset) = 0 \quad \emptyset - \text{zdarzenie niemożliwe (pusty podzbiór } \Omega)$$

$$P(A) \leq P(B), \text{ gdy } A \subset B \subset \Omega$$

$$P(A') = 1 - P(A), \text{ gdzie } A' \text{ oznacza zdarzenie przeciwne do zdarzenia } A$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B), \text{ dla dowolnych zdarzeń } A, B \subset \Omega$$

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B), \text{ dla dowolnych zdarzeń } A, B \subset \Omega$$

- Twierdzenie: Klasyczna definicja prawdopodobieństwa

Niech  $\Omega$  będzie skończonym zbiorem wszystkich zdarzeń elementarnych. Jeżeli wszystkie zdarzenia jednoelementowe są jednakowo prawdopodobne, to prawdopodobieństwo zdarzenia  $A \subset \Omega$  jest równe

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

gdzie  $|A|$  oznacza liczbę elementów zbioru  $A$ , zaś  $|\Omega|$  – liczbę elementów zbioru  $\Omega$ .

- Prawdopodobieństwo warunkowe

Niech  $A, B$  będą zdarzeniami losowymi zawartymi w  $\Omega$ , przy czym  $P(B) > 0$ . Prawdopodobieństwem warunkowym  $P(A|B)$  nazywamy liczbę

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym

Jeżeli zdarzenia losowe  $B_1, B_2, \dots, B_n$  zawarte w  $\Omega$  spełniają warunki:

1.  $B_1, B_2, \dots, B_n$  są parami rozłączne, tzn.  $B_i \cap B_j = \emptyset$  dla  $i \neq j$ ,  $1 \leq i \leq n$ ,  $1 \leq j \leq n$ ,
2.  $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$ ,
3.  $P(B_i) > 0$  dla  $1 \leq i \leq n$ ,

to dla każdego zdarzenia losowego  $A$  zawartego w  $\Omega$  zachodzi równość

$$P(A) = P(A|B_1) \cdot P(B_1) + P(A|B_2) \cdot P(B_2) + \dots + P(A|B_n) \cdot P(B_n)$$

## 15. PARAMETRY DANYCH STATYSTYCZNYCH

- Średnia arytmetyczna

Średnia arytmetyczna  $n$  liczb  $a_1, a_2, \dots, a_n$  jest równa:

$$\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

- Średnia ważona

Średnia ważona  $n$  liczb  $a_1, a_2, \dots, a_n$ , którym przypisano dodatnie wagi – odpowiednio:  $w_1, w_2, \dots, w_n$  jest równa:

$$\frac{w_1 \cdot a_1 + w_2 \cdot a_2 + \dots + w_n \cdot a_n}{w_1 + w_2 + \dots + w_n}$$

- Średnia geometryczna

Średnia geometryczna  $n$  nieujemnych liczb  $a_1, a_2, \dots, a_n$  jest równa:

$$\sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$$

- Mediana

Medianą uporządkowanego w kolejności niemalejącej zbioru  $n$  danych liczbowych  $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n$  jest:

- dla  $n$  nieparzystych:  $a_{\frac{n+1}{2}}$  (środkowy wyraz ciągu)
- dla  $n$  parzystych:  $\frac{1}{2}(a_{\frac{n}{2}} + a_{\frac{n}{2}+1})$  (średnia arytmetyczna środkowych wyrazów ciągu)

- Wariancja i odchylenie standardowe

Wariancją  $n$  danych liczbowych  $a_1, a_2, \dots, a_n$  o średniej arytmetycznej  $\bar{a}$  jest liczba:

$$\sigma^2 = \frac{(a_1 - \bar{a})^2 + (a_2 - \bar{a})^2 + \dots + (a_n - \bar{a})^2}{n} = \frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n} - (\bar{a})^2$$

Odchylenie standardowe  $\sigma$  jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji.

## 16. GRANICA CIĄGU

- Granica sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu ciągów

Dane są ciągi  $(a_n)$  i  $(b_n)$ , określone dla  $n \geq 1$ .

Jeżeli  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  oraz  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , to

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = a - b \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$$

Jeżeli ponadto  $b_n \neq 0$  dla  $n \geq 1$  oraz  $b \neq 0$ , to

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$$

- Suma wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego

Dany jest nieskończony ciąg geometryczny  $(a_n)$ , określony dla  $n \geq 1$ , o ilorazie  $q$ .

Niech  $(S_n)$  oznacza ciąg sum początkowych wyrazów ciągu  $(a_n)$ , to znaczy ciąg określony wzorem

$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$  dla  $n \geq 1$ . Jeżeli  $|q| < 1$ , to ciąg  $(S_n)$  ma granicę

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a_1}{1 - q}$$

Tę granicę nazywamy sumą wszystkich wyrazów ciągu  $(a_n)$ .

## 17. POCHODNA FUNKCJI

- Pochodna sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji

$$[c \cdot f(x)]' = c \cdot f'(x) \text{ dla } c \in R$$

$$[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x)$$

$$[f(x) - g(x)]' = f'(x) - g'(x)$$

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$\left[ \frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}, \text{ gdy } g(x) \neq 0$$

- Pochodne niektórych funkcji

Niech  $a, b, c$  będą dowolnymi liczbami rzeczywistymi,  $n$  dowolną liczbą całkowitą.

funkcja	pochodna funkcji
$f(x) = c$	$f'(x) = 0$
$f(x) = ax + b$	$f'(x) = a$
$f(x) = ax^2 + bx + c$	$f'(x) = 2ax + b$
$f(x) = \frac{a}{x}, x \neq 0$	$f'(x) = \frac{-a}{x^2}$
$f(x) = x^n$	$f'(x) = nx^{n-1}$

- Równanie stycznej

Jeżeli funkcja  $f$  ma pochodną w punkcie  $x_0$ , to równanie stycznej do wykresu funkcji  $f$  w punkcie  $(x_0, f(x_0))$  dane jest wzorem

$$y = ax + b,$$

gdzie współczynnik kierunkowy stycznej jest równy wartości pochodnej funkcji  $f$  w punkcie  $x_0$ , to znaczy  $a = f'(x_0)$ , natomiast  $b = f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_0$ . Równanie stycznej możemy zapisać w postaci

$$y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

## 18. TABLICA WARTOŚCI FUNKCJI TRYGNOMETRYCZNYCH

$\alpha [^\circ]$	$\sin \alpha$ $\cos \beta$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\beta [^\circ]$
<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>90</b>
1	0,0175	0,0175	89
2	0,0349	0,0349	88
3	0,0523	0,0524	87
4	0,0698	0,0699	86
5	0,0872	0,0875	85
6	0,1045	0,1051	84
7	0,1219	0,1228	83
8	0,1392	0,1405	82
9	0,1564	0,1584	81
<b>10</b>	<b>0,1736</b>	<b>0,1763</b>	<b>80</b>
11	0,1908	0,1944	79
12	0,2079	0,2126	78
13	0,2250	0,2309	77
14	0,2419	0,2493	76
15	0,2588	0,2679	75
16	0,2756	0,2867	74
17	0,2924	0,3057	73
18	0,3090	0,3249	72
19	0,3256	0,3443	71
<b>20</b>	<b>0,3420</b>	<b>0,3640</b>	<b>70</b>
21	0,3584	0,3839	69
22	0,3746	0,4040	68
23	0,3907	0,4245	67
24	0,4067	0,4452	66
25	0,4226	0,4663	65
26	0,4384	0,4877	64
27	0,4540	0,5095	63
28	0,4695	0,5317	62
29	0,4848	0,5543	61
<b>30</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,5774</b>	<b>60</b>
31	0,5150	0,6009	59
32	0,5299	0,6249	58
33	0,5446	0,6494	57
34	0,5592	0,6745	56
35	0,5736	0,7002	55
36	0,5878	0,7265	54
37	0,6018	0,7536	53
38	0,6157	0,7813	52
39	0,6293	0,8098	51
<b>40</b>	<b>0,6428</b>	<b>0,8391</b>	<b>50</b>
41	0,6561	0,8693	49
42	0,6691	0,9004	48
43	0,6820	0,9325	47
44	0,6947	0,9657	46
45	0,7071	1,0000	45

$\alpha [^\circ]$	$\sin \alpha$ $\cos \beta$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\beta [^\circ]$
46	0,7193	1,0355	44
47	0,7314	1,0724	43
48	0,7431	1,1106	42
49	0,7547	1,1504	41
<b>50</b>	<b>0,7660</b>	<b>1,1918</b>	<b>40</b>
51	0,7771	1,2349	39
52	0,7880	1,2799	38
53	0,7986	1,3270	37
54	0,8090	1,3764	36
55	0,8192	1,4281	35
56	0,8290	1,4826	34
57	0,8387	1,5399	33
58	0,8480	1,6003	32
59	0,8572	1,6643	31
<b>60</b>	<b>0,8660</b>	<b>1,7321</b>	<b>30</b>
61	0,8746	1,8040	29
62	0,8829	1,8807	28
63	0,8910	1,9626	27
64	0,8988	2,0503	26
65	0,9063	2,1445	25
66	0,9135	2,2460	24
67	0,9205	2,3559	23
68	0,9272	2,4751	22
69	0,9336	2,6051	21
<b>70</b>	<b>0,9397</b>	<b>2,7475</b>	<b>20</b>
71	0,9455	2,9042	19
72	0,9511	3,0777	18
73	0,9563	3,2709	17
74	0,9613	3,4874	16
75	0,9659	3,7321	15
76	0,9703	4,0108	14
77	0,9744	4,3315	13
78	0,9781	4,7046	12
79	0,9816	5,1446	11
<b>80</b>	<b>0,9848</b>	<b>5,6713</b>	<b>10</b>
81	0,9877	6,3138	9
82	0,9903	7,1154	8
83	0,9925	8,1443	7
84	0,9945	9,5144	6
85	0,9962	11,4301	5
86	0,9976	14,3007	4
87	0,9986	19,0811	3
88	0,9994	28,6363	2
89	0,9998	57,2900	1
<b>90</b>	<b>1,0000</b>	<b>–</b>	<b>0</b>



Centralna Komisja Egzaminacyjna  
ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa  
tel. (22) 53-66-500, fax (22) 53-66-504  
www.cke.edu.pl, e-mail: ckesekr@cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku  
ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk  
tel. (58) 32-05-590, fax (58) 32-05-591  
www.oke.gda.pl, e-mail: komisja@oke.gda.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi  
ul. Praussa 4, 94-203 Łódź  
tel. (42) 63-49-133, fax (42) 63-49-154  
www.oke.lodz.pl, e-mail: komisja@komisja.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie  
ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno  
tel. (32) 78-41-615, fax (32) 78-41-608  
www.oke.jaw.pl, e-mail: oke@oke.jaw.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu  
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań  
tel. (61) 85-40-160, fax (61) 85-21-441  
www.oke.poznan.pl, e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków  
tel. (12) 68-32-101, fax (12) 68-32-100  
www.oke.krakow.pl, e-mail: oke@oke.krakow.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie  
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa  
tel. (22) 45-70-335, fax (22) 45-70-345  
www.oke.waw.pl, e-mail: info@oke.waw.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży  
Al. Legionów 9, 18-400 Łomża  
tel. (86) 47-37-120, fax (86) 47-36-817  
www.oke.lomza.pl, e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu  
ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław  
tel. (71) 78-51-894, fax (71) 78-51-866  
www.oke.wroc.pl, e-mail: sekretariat@oke.wroc.pl